

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会
指導部住所 三重県津市広明町323-1
Tel 059-228-1205
HP <http://www.miegyoren.or.jp/>

(海況情報)12月9日調査時点

【水温】 各漁場の水温は14.1～16.7℃です。
【プランクトン】 鈴鹿地区において大型珪藻(ユーカンピア属)を確認。
今後の動向に注意して下さい。【栄養塩量】
桑名、鈴鹿若松、鳥羽菅島で十分量。その他の地区で少なく、
中勢地区では極端に少なくなっています。
【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁)
予測潮位に比べて+9cm～+16cmで推移。
8日0:00—12:00時点★情報収集、普及活動、試験分析担当
＜桑名～南勢明和＞津農林水産事務所水産
室 (tel)059-223-5128
＜南勢伊勢～鳥羽＞伊勢農林水産事務所水
産室(tel)0596-27-5189
＜鳥羽＞鳥羽市水産研究所
(tel)0599-25-3316
＜試験分析等＞
三重県水産研究所鈴鹿水産研究室
(tel)059-386-0163

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りし

【お知らせ】
次回の栄養塩動向調査は
12月16日(水)です。

採水は12月15日(火)です。

海況に留意し、可能な範囲で行ってください。

木曽岬
273 ↑
城南
157 —
伊曾島(新田)
218 ↑漁場名
窒素量 ↑ (先週比増減)
プランクトン
発生密度(cells/ml) ○
※正確な発生範囲とは一致しません。

《鈴鹿地区の状況・9日》

(下箕田・若松)
現在、1回目生産中。
色調、伸びともに回復。(白子)
1回目の摘採を終了。
全域で色落ちが確認がみられるも、8日以降回復の兆し。

《中勢地区の状況・9・10日》

(津市)
色調は回復傾向。伸びはやや不調で
カモによる食害の可能性がある。(松阪)
岸側漁場では、カモ食害と思われるバリカン症が深刻化。
養殖網をできるだけ沈めてカモの食害を防ぐ予定。
沖側漁場では、魚類による食害が継続。

《南勢地区(伊勢湾漁協)の状況・9日》

(下御糸・大淀)
12月5日より初摘採。現在1回目生産中。製品についても良好。
色調は回復したが伸びが不調。カモ、魚類による食害と思われ
るバリカン症を確認。(今一色)
沖、支柱漁場ともに、1回目～2回目生産中。
12月11日の初市共販では黒バラのり68kgのほか、みえの技のり
選考会(9日)にて食味審査を通過した技等級の製品も出品予定。

《桑名地区の状況・9日》

(木曽岬・伊曾島・赤須賀)
12月9日から本張りを開始。
一部秋芽網を実施している地区は、食害対策としての
防除網を試行しながら本養殖を継続中。

アサクサノリは本養殖を継続中。

海況、注意点等

鈴鹿地区、南勢地区(大淀)でも本格生
産を開始。12月11日黒のり共販第1
回汐の出品予想枚数は184万。菅島、今一色に続き、鈴鹿(下箕
田・若松)でも生産が始まりました。
本格生産に向けて今一度、加工機材
の点検、設備の清掃等入念に行っ
ていただき、異物混入防止に努めてく
ださい。各地でバリカン症を確認。栄養塩量
は鈴鹿でやや回復するも、降雨なく
少ない状況続く。各漁場で食害と思われるバリカン
症が確認されています。効果的な対
処が難しいところですが、防除網、
網下げ等で一定の効果があるとされ、
これらの対策も視野に、今後の生育
状況に注意して下さい。12月11日(金) 第1回汐 初市
共販出品見込み数量鈴鹿地区 33万枚 (下箕田28、若松5)
中南勢地区 54万枚 (大淀4 今一色50)
鳥羽地区 97万枚 (菅島97)

【合計】 184万枚

(12月9日時点)

《鳥羽地区の状況・9日》

(桃取)
現在養殖中。色調、伸びともにまずまず。(答志)
現在養殖中。色調、伸びともにまずまず。
網は酸処理するときれいになるがすぐに汚れる。
12月11日～13日に初摘採を予定。(菅島)
秋芽網3回目生産中。色調は回復傾向。
冷凍網は12月2日までに本張りを完了、
現在養殖中、色調、伸びともにまずまず。【栄養塩動向調査が携帯電話で閲覧できます】
<http://osakana-mie.com/producer/phone.cgi>
上記アドレスをbookmark登録してご利用ください。
または、右側の二次元バーコードをカメラ付携帯
電話で読み取り表示されたアドレスにアクセスし
てください。
*機種によっては利用できない場合があります。