

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会
指導部

住所 三重県津市広明町323-1
Tel 059-228-1205
HP <http://www.miegyoren.or.jp/>

(海況情報)12月1日調査時点

【水温】13.7~16.9℃。 平年並み~一部漁場でやや高めで推移。
【プランクトン】 県内広域、特に中勢地区で高密度発生中。
今後のプランクトン動向に要警戒。

【栄養塩量】
桑名地区を除き少ない。※11月30日(降雨前)の数値。

【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁)
予測潮位 -14cm ~ +37cm 高め推移。※30日時化の影響あり


★情報収集、普及活動、試験分析担当

<桑名~南勢明和>
津農林水産事務所水産室
(tel)059-223-5128
<南勢伊勢~鳥羽>
伊勢農林水産事務所水産室
(tel)0596-27-5189
<鳥羽>鳥羽市水産研究所
(tel)0599-25-3316
<試験分析等>
三重県水産研究所鈴鹿水産研究室

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りし

【お知らせ】

次回、栄養塩調査は
12月8日(水)です。



《桑名地区の状況・1日》

(木曾岬・伊曾島・赤須賀)
本張りの開始は海況を見ながら12月10日以降を予定。
一部生産者が実施している秋芽網、アサクサノリは、
本養殖を継続中。
秋芽網では一部バリカン症が発生中。
食害・病害いずれが原因かは不明。

海況、注意点等

11月29日南勢今一色初摘採。
鳥羽菅島、今週末摘採見込むも厳しい状況。

県内広域色落ち発生中。
高密度植物プランクトン要警戒※。
(※11月30日時点 時化前)

桑名地区を除く県内各地では張り込みが概ね終了し本養殖が開始されています。ここ1ヵ月漁場栄養塩は低調で推移し、先週以降では中南勢で極端に少ない状況、加えて中勢地区を中心にスケルトネマを優占種とする植物プランクトンが高密度で発生しています。(※11月30日採水時点)
摘採を開始した今一色、目前に控える菅島でも色落ちが発生しており、今後生産に入る地区でも一刻も早い海況の回復を待つ状況です。

海況好転に期待。

11月30日深夜から1日未明にかけて県内強風雨となりました。今後しばらく北西風予報となり、週明け再度降雨予報です。河川供給による栄養塩濃度の上昇が予想されます。現在養殖中の各地区は生育状況に注意し海況回復に備えた操業計画を検討して下さい。

《鳥羽地区の状況・1日》

(桃取)
11月29日より本張り込みを開始し、30日にまでに完了本養殖を開始。
(答志)
11月29日より本張り込みを開始し、30日にまでに概ね完了。本養殖を開始。
(菅島)
秋芽網の色調、伸びともに不調。降雨後の海況回復を待ち、12月3日初摘採を予定していたが摘める状況になく延期を検討中。11月29日より冷凍網の張り込みを開始。

臨時採水の実施について

既報および、12月1日発行栄養塩情報について降雨後の動向が反映されていないことから下記日程で臨時の分析を行います。

12月3日(深夜)情報発行予定

※ 鳥羽地区においては担当者が直接採水に向かいますので送付は不要です。

黒のり生産者向け配信用アカウント★三重県黒のり養殖研究会LINE★にて配信中。

ご登録方法は漁連指導部・または所属の組合まで問合せ下さい。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Reader