

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会
指導部

住所 三重県津市広明町323-1
Tel 059-228-1205
HP <http://www.miegyoren.or.jp/>

(海況情報)2月7日調査時点

【水温】8.6~11.3℃。平年より高めで推移。

【プランクトン】
桑名(木曾岬、城南を除く)~鈴鹿漁場で高密度発生中。
優占種はスケルトネマ属。今後の動向に注意して下さい。

【栄養塩量】
木曾岬、城南で十分量、その他県内全域で少なく、特に下箕田、白子、桃取町、答志上手(内)、答志上手(外)で極端に少なくなっています。

【潮位情報】名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁)
予測潮位 -16cm ~ +24cm で推移。


★情報収集、普及活動、試験分析担当

<桑名~南勢明和>
津農林水産事務所水産室
(tel)059-223-5128
<南勢伊勢~鳥羽>
伊勢農林水産事務所水産室
(tel)0596-27-5189
<鳥羽>鳥羽市水産研究所
(tel)0599-25-3316
<試験分析等>
三重県水産研究所鈴鹿水産研究室

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断り

【お知らせ】
次回、栄養塩調査は 2月14日(水)
採水は2月13日(火)です。
海況に留意し、可能な範囲で行ってください。

採水ボトルの不足や
調査に関する問い合わせは
漁連指導部の山中・下村まで
お願い致します。



漁場名
窒素量 ↑ (先週比増減)
プランクトン
発生密度(cells/ml) ○
※正確な発生範囲とは一致しません。

《鈴鹿地区の状況・7日》
(下箕田・若松・白子)
・先週に引き続き、色調、伸び低調。
・生産は継続している。

《中勢地区の状況・7日》
(松阪)
・先週に引き続き色調、伸びともに低調。
・タカ側漁場では良い色調を維持。

《南勢地区(伊勢湾漁協)の状況・8日》
(下御糸・大淀)
・現在5回目生産中。
・色調、伸びともに低調。

(今一色)
・5日から色調低下を確認。
・先週、色調が回復してから再度食害が散見。

《桑名地区の状況・7日》
(伊曾島、木曾岬、赤須賀、城南)
・色調、伸びともに好調。
・一部漁場でクサレがみられるものの、問題ない程度。

海況、注意点等

県内漁場、栄養塩低調続く。
桑名を除き色調浅め、伸び鈍化。
週明けにかけて、県内まとまった降雨となりましたが、漁場栄養塩量は先週と比べてやや増加した地区もみられるものの依然低調で、先週に続き、南勢、鳥羽方面でも色調低下が確認されています。
現在、伊勢湾内の植物プランクトンはやや小康状態となっていますが、この先しばらく、まとまった降雨も少ない予想で厳しい海況が続く可能性があります。海況、色調をこまめに注意した生産計画をお願いします。

今後の注意点等

この先、次週14日頃から全国的にかなり暖かな日となる予報です。同時に週後半にかけて小潮となる潮回りの為、プランクトン発生動向、桑名地区等ではアカグサレに十分警戒して下さい。

2月9日(金) 第4回汐共販出品見込み数量

桑名	542万枚
鈴鹿	474万枚 (下箕田110、若松66、白子298)
中勢	35万枚
南勢	343万枚 (大淀208 今一色135)
鳥羽	695万枚 (桃取200、答志252、菅島243)

【合計】 2,089万枚 (2月8日正午時点)

《鳥羽地区の状況・7日》

(桃取)
・2/5に摘採。
・先週に比べ色調低下。
・等級は特~1等くらい。

(答志)
2/3に摘採。
・摘採後に色調低下。
・色調、伸びともに低調。

(菅島)
・2/5に摘採。
・表漁場は色調低下を確認。
・裏漁場は少し色調回復したが伸び低調。

クロロフィル情報 (8日午前7時点)

桑名	鈴鹿	松阪	伊勢	鳥羽
注意	注意	注意	注意	注意

観測するクロロフィル値(色落ちの原因となる植物プランクトンの発生量の指標)に基づき、警戒、注意、発表なし、の3段階で表示します。

警戒	値3.5以上を継続して観測。色落ちの危険あり。
注意	値3.5以上を観測。今後の動向に注意。
—	平常値。顕著な発生なし。

黒のり生産者向け配信用アカウント★三重県黒のり養殖研究会LINE★にて配信中。

ご登録方法は漁連指導部・または所属の組合まで問合せ下さい。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。