

令和7年度 第 1 報 (10月9日)

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会 指導部

住所 三重県津市広明町323-1

Tel 059-228-1205

HP http://www.miegyoren.or.jp/

(海況情報)10月9日調査時点

【水温】 23.5～25.0℃。

【プランクトン】 城南、鈴鹿地区にて高密度に発生中。今後の動向に注意して下さい。

【栄養塩量】 桑名地区、中勢地区では十分量。鈴鹿地区、南勢地区、鳥羽地区ではやや少ない～極端に少なくなっています。

【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁) 予測潮位 -28 cm ～ 0 cm で推移。

★情報収集、普及活動、試験分析担当

<桑名～南勢明和>

津農林水産事務所水産室

(tel)059-223-5128

<南勢伊勢～鳥羽>

伊勢農林水産事務所水産室

(tel)0596-27-5189

<鳥羽>鳥羽市水産研究所

(tel)0599-25-3316

<試験分析等>

三重県水産研究所鈴鹿水産研究室

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りし

[お知らせ]

次回、栄養塩調査は 10月16日(水)

採水は10月15日(火)です。

海況に留意し、可能な範囲で行ってください。

採水ボトルの不足や調査に関する問い合わせは漁連指導部の谷口・下村までお願い致します。

漁場名

窒素量 (先週比増減)

プランクトン

発生密度(cells/ml)

※正確な発生範囲とは一致しません。

《桑名地区の状況・7日》

(伊曾島、木曽岬、赤須賀、城南)

・9月24日～29日で陸上採苗を実施。

アサクサノリは10月3日に 陸上採苗。

・現在、支柱の設置作業中。

《鈴鹿地区の状況・7日》

(白子、下箕田、若松)

・育苗漁場の支柱設置待ち。

・海上採苗は、水温低下待ち。

・一部生産者が伊曾島漁協にて陸上採苗を実施。

《中勢地区の状況・7日》

(松阪)

・9月24日～27日で陸上採苗を実施。順調に終了。

・育苗開始は水温低下待ち。

《南勢地区(伊勢湾漁協)の状況・7日》

(下御糸・大淀)

・9月24日～27日で陸上採苗を実施。順調に終了。

・育苗開始は水温低下待ち。

(今一色)

・9月26日～10月4日に陸上採苗を実施。

・育苗開始は水温低下待ち。

《鳥羽地区の状況・7日》

各地区9月25日～9月28日にかけて陸上採苗を実施。

(桃取)

・筏設置作業中。

・育苗開始は水温低下待ち。

(答志)

・筏設置作業中。

(菅島)

・表漁場の筏設置完了。

・裏漁場は台風通過後に設置予定。

《黒潮大蛇行の動向》

気象庁、県水産研究所によると黒潮蛇行は今年に入り解消しつつあります。その影響か、伊勢湾観測および熊野灘沿岸の観測では底層水温が例年よりも低く、また7月以降観測潮位がおよそ20～30cmほど低い状態が続いています。ここ数年、高潮位基調で推移していた伊勢湾内、特に支柱養殖を行う桑名地区、今一色地区では、日々の潮位をこまめに確認し、網高の調整(干しすぎ)に注意して下さい。

今漁期も生産者皆様の健康と安全、豊作を祈念いたします。

クロロフィル情報 (8日午後18時点)

桑名	鈴鹿	松阪	伊勢	鳥羽
警戒	警戒	注意	注意	注意
観測するクロロフィル値(色落ちの原因となる植物プランクトンの発生量の指標)に基づき、警戒、注意、発表なし、の3段階で表示します。				
警戒	値3.5以上を継続して観測。色落ちの危険あり。			
注意	値3.5以上を観測。今後の動向に注意。			
—	平常値。顕著な発生なし。			

黒のり生産者向け配信用アカウント★三重県黒のり養殖研究会LINE★にて配信中。
ご登録方法は漁連指導部・または所属の組合まで問合せ下さい。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。