

令和7年度 第 2 報 (10月16日)

三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会 指導部

住所 三重県津市広明町323-1

Tel 059-228-1205

HP http://www.miegyoren.or.jp/

(海況情報)10月15日調査時点
【水温】 22.8～23.6℃。
【プランクトン】 桑名地区で発生中。其他地区で減少傾向。
【栄養塩量】 桑名地区、浜田、今一色では十分量、其他地区では少なくなっており、城南では極端に少なくなっています。今後の動向に注意して下さい。
【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁) 予測潮位 -15 cm ～ +14 cm で推移。

★情報収集、普及活動、試験分析担当
<桑名～南勢明和>
津農林水産事務所水産室
(tel)059-223-5128
<南勢伊勢～鳥羽>
伊勢農林水産事務所水産室
(tel)0596-27-5189
<鳥羽>鳥羽市水産研究所
(tel)0599-25-3316
<試験分析等>
三重県水産研究所鈴鹿水産研究室
(tel)059-386-0163

☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りします。

[お知らせ]

次回、栄養塩調査は 10月22日(水)
採水は10月21日(火)です。
海況に留意し、可能な範囲で行ってください。

採水ボトルの不足や
調査に関する問い合わせは
漁連指導部の谷口まで
お願い致します。

《桑名地区の状況・14日》
(伊曾島、木曽岬、赤須賀、城南)
・支柱の設置作業中。
・育苗開始日程は来週に決まる予定。

海況、注意点等
鈴鹿地区で24日より海上採苗開始予定。
其他地区では、支柱・筏の設置など育苗
へ向けた準備が進んでおります。

県内北部で植物プランクトン発生中
先週に引き続き、植物プランクトンが桑
名～鈴鹿地区において発生しております。
桑名地区では栄養塩の低下が確認されて
おり、南勢地区ではプランクトンの発生
は顕著ではないものの、栄養塩量はやや
少なめとなっております。
今後の動向には注意が必要です。

気象予報
気象庁によると、20日までは平年より気
温が高くなり、それ以降は平年並みとな
る見込みです。
また、11月の気温は平年並みか高めを推
移する予報となっております。
育苗開始が近づいておりますので、水温、
気温には十分に注意して下さい。

(のり芽検診のご案内)

のり芽検診を希望される漁協(研究会)は、
漁連指導部 谷口までご連絡下さい。
(TEL:059-228-1205)
検診日と実施場所の調整をさせていただきます。

(協力)県水産研究所鈴鹿水産研究室

《鳥羽地区の状況・14日》
(桃取)
・筏設置作業中。
・育苗開始は水温低下待ち。
(答志)
・筏設置作業中。
・育苗開始は水温低下待ち。
(菅島)
・裏漁場の筏設置作業中。
・育苗開始は水温低下待ち。

《鈴鹿地区の状況・15日》
(下箕田、若松)
・支柱設置は7割程が完了。
・海上採苗は、24日からの予定。
(白子)
・支柱設置は概ね完了。
・海上採苗は24日からの予定。

《中勢地区の状況・14日》
(松阪)
・育苗開始は水温低下待ち。

《南勢地区(伊勢湾漁協)の状況・14日》
(下御糸・大淀)
・10月17日から漁場割り、育苗施設設置予定。
・育苗開始は水温低下待ち。
(今一色)
・育苗開始は水温低下待ち。

《桑名地区の状況・14日》
(木曽岬)
184 ↓
(伊曾島(新田))
234 ↓
(城南)
10 ↓
(下箕田)
21 ↑
(浜田)
344 ↑
(白子)
20 ↓
(白塚)
欠
(東黒部)
欠
(大淀)
75 ↑
(今一色(台場))
158 ↑
(桃取)
48 ↑
(答志上手)
50 ↑
(大答志)
65 ↑
(菅島(表))
欠
(菅島(裏))
欠
(安楽島)
64 ↑

漁場名
窒素量 ↑ (先週比増減)
プランクトン
発生密度(cells/ml) ○
※正確な発生範囲とは一致しません。

クロロフィル情報 (15日午後18時点)

桑名	鈴鹿	松阪	伊勢	鳥羽
警戒	注意	—	—	—

観測するクロロフィル値(色落ちの原因となる植物プランクト
ンの発生量の指標)に基づき、警戒、注意、発表なし、の3段
階で表示します。

警戒	値3.5以上を継続して観測。色落ちの危険あり。
注意	値3.5以上を観測。今後の動向に注意。
—	平常値。顕著な発生なし。

黒のり生産者向け配信用アカウント★三重県黒のり養殖研究会LINE★にて配信中。
ご登録方法は漁連指導部・または所属の組合まで問合せ下さい。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。