

# 三重県のり情報

発行 三重県漁業協同組合連合会 指導部

住所 三重県津市広明町323-1  
Tel 059-228-1205  
HP <http://www.miegyoren.or.jp/>

(海況情報)12月17日調査時点

【水温】 10.1~14.1℃。

【プランクトン】  
県内全域で顕著な発生は確認されていません。

【栄養塩量】  
県内全域で増加傾向。  
桑名地区~南勢地区で十分量、東黒部、鳥羽地区でやや少なくなっています。

【潮位情報】 名古屋港の潮位偏差・毎時偏差速報値(気象庁)  
予測潮位 -27 cm ~ 21 cm で推移。**潮位偏差に注意。**  
今後の動向に注意して下さい。

★情報収集、普及活動、試験分析担当  
<桑名~南勢明和>  
津農林水産事務所水産室  
(tel)059-223-5128  
<南勢伊勢~鳥羽>  
伊勢農林水産事務所水産室  
(tel)0596-27-5189  
<鳥羽>鳥羽市水産研究所  
(tel)0599-25-3316  
<試験分析等>  
三重県水産研究所鈴鹿水産研究室  
(tel)059-386-0163


☆本紙の無断転用・複写等は固くお断りします。

## 【お知らせ】

年末年始の採水について  
次回、栄養塩調査は 12月24日(水)  
採水は12月23日(火)です。  
また、年明け12月31(水)の分析は  
お休みさせていただきます。

## 年明け予定

採水 1月6日(火)  
栄養塩調査 1月7日(水)



漁場名  
窒素量 ↑ (先週比増減)  
プランクトン  
発生密度(cells/ml)  
※正確な発生範囲とは一致しません。

《桑名地区の状況・16日》  
(伊曾島、木曾岬、赤須賀、城南)  
・冷凍網は16日から摘採開始。  
・色・伸びともに良好。

## 海況、注意点等

松阪、大淀、答志で初摘採。  
県内全漁場で生産開始。  
今週に入り、県内全漁場で初摘採をむかえております。先週の西風によるプランクトンの減少、降雨により栄養塩は増加傾向にあり、県内では色のある海苔が生産されております。  
気象庁によると、今週末にかけてまとまった降雨が予想されており、さらなる栄養塩の流入が期待されます。また来週から気温が例年より高めに推移することが予想されており海苔の状態には十分に注意して下さい。

## 初市出品枚数

12月24日(木)の三重県黒のり初市の各地区の出品数量以下の通りになる見込みです。(18日午前時点)

|      |                    |     |      |
|------|--------------------|-----|------|
| 桑名   | 5万枚                | 下箕田 | 30万枚 |
| 若松   | 10万枚               | 白子  | 80万枚 |
| 大淀   | 50万枚               | 今一色 | 50万枚 |
| 桃取   | 50万枚               | 菅島  | 50万枚 |
| 答志   | 15万枚               |     |      |
| 合計枚数 | 約340万枚(前年同回:388万枚) |     |      |

次回のり情報の発行は1月8日(木)です。  
年末年始、引き続き操業安全第一で、体調は万全に整えていただき、最盛期に備えていただきますようお願いいたします。  
来年もよろしくお願い致します。

## 《鈴鹿地区の状況・16日》


- (下箕田)  
・1回目の摘採中。19~20日に2回目の摘採予定。  
・色調・伸びともに良好。
- (若松)  
・1回目の摘採中。18日から2回目の摘採予定。  
・色調・伸びともに良好。
- (白子)  
・1回目の摘採中。早い生産者で19日から2回目の摘採予定。  
・色調良好、伸び普通。

## 《中勢地区の状況・16日》

- (松阪)  
・17日から摘採開始。  
・カモによる食害が多い。

## 《南勢地区(伊勢湾漁協)の状況・16日》

- (下御糸・大淀)  
・12日から摘採開始。14日摘採分からシニ葉が混じる。  
・色調回復、伸びは場所によりムラがある。
- (今一色)  
・色調・伸びともに良好。  
・順調に生産中。



## 《鳥羽地区の状況・17日》

- (桃取)  
・秋芽網は3回目の摘採中。色調まずまず。  
・冷凍網は17日から2回目の摘採。伸びまずまず。  
・色調は回復傾向。
- (答志)  
・色調・伸びともにまずまず。  
・16日から初摘採。  
・海色も悪くない。
- (菅島)  
・表漁場は2回目の摘採中。伸び悪くない。  
・色は特クラス。  
・裏漁場は18日頃から摘採予定。  
・伸び悪くないがヨゴレが多い。

## クロロフィル情報 (17日午後18時点)

| 桑名 | 鈴鹿 | 松阪 | 伊勢 | 鳥羽 |
|----|----|----|----|----|
| —  | —  | —  | —  | —  |

観測するクロロフィル値(色落ちの原因となる植物プランクトンの発生量の指標)に基づき、警戒、注意、発表なし、の3段階で表示します。

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 警戒 | 値3.5以上を継続して観測。色落ちの危険あり。 |
| 注意 | 値3.5以上を観測。今後の動向に注意。     |
| —  | 平常値。顕著な発生なし。            |

黒のり生産者向け配信用アカウント★三重県黒のり養殖研究会LINE★にて配信中。

ご登録方法は漁連指導部・または所属の組合まで問合せ下さい。※PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。